SURCO ZINC BORO LÍQUIDO ®

Ficha Técnica

FERTILIZANTE FOLIAR

El Surco **ZINC-BORO LÍQUIDO®** reúne en un sólo producto los principales elementos menores, en la concentración y balance adecuado. La formulación, diseñada con ácidos fúlvicos y amino-ácidos, hacen que los nutrimentos aportados sean asimilados fácil y rápidamente. Es ideal para etapas iniciales de desarrollo, prefloración y cuajado de los cultivos o para tratar deficiencias de elementos menores.

Composición Química	P/V
Zinc (Zn)	7.59 %
Boro (B)	3.77 %
Azufre (S)	4.91 %
Cobre (Cu)	1.05 %
Molibdeno (Mo)	0.11 %
Materia Orgánica	0.663 %

Los elementos menores, son requeridos en pequeñas cantidades por las plantas, pero esenciales en cantidad y balance adecuado para el desarrollo de todo cultivo, por lo que, la escasez de alguno de ellos será limitante en la producción.

Poás, Alajuela, Costa Rica
Tel: (506) 2448-6676 / 2448-3110
WhatsApp: 8626-2725
ecoinsu@ice.co.cr/ecotecnico05@gmail.com
www.ecoinsumos.com

SURCO ZINC BORO LÍQUIDO ®

Ficha Técnica

DOSIS Y FRECUENCIA.

Aplicación Foliar*:* Aplicar de 2 a 4 litros por hectárea o 1 litro por 200 litros de agua, con una frecuencia que varía con el cultivo y el objetivo.

Fertirriego o drench*:* Aplicar a la base de la planta cuando se observen de 3 a 4 hojas verdaderas y durante el desarrollo sobre el área de raíces, según tipo y necesidad del cultivo. Usar una dosis de 2 a 6 litros por hectárea o 2 litros por cada 200 litros de agua.

USO PARA APLICACIONES AÉREAS.

Arroz (*Oryza sativa*), Banano y Plátano (*Musa spp*.), Caña de Azúcar (*Saccharum officinarum*), Cítricos (*Citrus spp*.), Melón (*Cucumis melo*), Palma (*Elaeis guineensis*), y Piña (*Ananas comosus*). La dosis es 1 – 2 litros por hectárea. Utilizar con un volumen de caldo de aplicación de 15 – 75 L. Se debe cumplir con las recomendaciones de aplicación aérea, indicadas en el Decreto N° 44083 – MAG – MOPT – S – MINAE – MTSS (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola).

INSTRUCCIONES DE USO, COMPATIBILIDAD Y MANEJO DE MEZCLAS.

Aunque el Surco Zinc-Boro posee un pH ligeramente ácido (4.0-4.5), se recomienda realizar siempre una prueba de compatibilidad antes de adicionar al tanque de fumigación.

Si se van a mezclar 2 o más productos, agregarlos al tanque de mezcla por separado, el cuál a de contener al menos un 70% del agua total.

Poás, Alajuela, Costa Rica
Tel: (506) 2448-6676 / 2448-3110
WhatsApp: 8626-2725
ecoinsu@ice.co.cr/ecotecnico05@gmail.com
www.ecoinsumos.com



Ficha Técnica

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Utilizar el equipo de protección personal (botas, guantes, mascarilla, anteojos y protección corporal). No ingerir alimentos o bebidas, ni fumar durante la preparación de la mezcla o aplicación del producto. El personal encargado debe estar debidamente calificado en el uso de productos fitosanitarios.

Conservar el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación solar directa.

Agitar adecuadamente el envase antes de verter el producto al tanque de mezcla.

Distribuido por ECOINSUMOS, S.A

Poás, Alajuela, Costa Rica
Tel: (506) 2448-6676 / 2448-3110
WhatsApp: 8626-2725
ecoinsu@ice.co.cr/ecotecnico05@gmail.com
www.ecoinsumos.com